

Lista III.

Miara łukowa kąta. Definicje i własności funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Wzory redukcyjne. Tożsamości trygonometryczne.

3.1. Z wierzchołka kąta α jako ze środka zakreślono okrąg o promieniu długości r . Dane są miara kąta α w radianach i długość promienia r . Oblicz długość łuku, na którym jest oparty kąt α .

3.2. Uzupełnij poniższe tabele:

miara kąta w stopniach	1°	30°	45°	60°	90°	120°	225°	315°	450°	570°
miara kąta w radianach										

miara kąta w radianach	1	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7}{12}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{8}{9}\pi$	$\frac{7}{6}\pi$	$\frac{5}{3}\pi$	2π
miara kąta w stopniach										

3.3. Oblicz wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dla kątów o następujących miarach: 135°, 150°, 240°, 1740°, 660°, -150°.

3.4. Wyraż za pomocą funkcji trygonometrycznych kątów dodatnich nie większych od 45°: $\sin 115^\circ$, $\cos 315^\circ$, $\operatorname{tg} 165^\circ$, $\operatorname{ctg} 85^\circ$.

3.5. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta α , jeżeli:

(a) $\sin \alpha = \frac{15}{17}$ i $90^\circ < \alpha < 180^\circ$,

(b) $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ i $270^\circ < \alpha < 360^\circ$,

(c) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{7}{24}$ i $180^\circ < \alpha < 270^\circ$,

(d) $\sin \alpha = -\sqrt{0,2}$ i $180^\circ < \alpha < 270^\circ$.

3.6. Uzupełnij poniższe tabele. Jeśli kąt nie istnieje, wpisz znak \times :

		$\alpha \in$			
		$(0, 90^\circ)$	$(90^\circ, 180^\circ)$	$(180^\circ, 270^\circ)$	$(270^\circ, 360^\circ)$
cos α	$\frac{1}{2}$				
	$-\frac{1}{2}$				
	$\frac{\sqrt{2}}{2}$				
	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$				
	$\frac{\sqrt{3}}{2}$				
	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$				

		sin α					
		$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos α	$\frac{1}{2}$						
	$-\frac{1}{2}$						
	$\frac{\sqrt{2}}{2}$						
	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$						
	$\frac{\sqrt{3}}{2}$						
	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$						

3.7. Zbadaj, czy istnieje kąt α , taki że:

(a) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ i $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{3}$, (b) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ i $\sin \alpha = \frac{3}{5}$.

3.8. Oblicz:

(a) $\sin(\alpha + 45^\circ)$ mając dane: $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ i $90^\circ < \alpha < 180^\circ$,

(b) $\cos(60^\circ - \alpha)$ mając dane: $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$ i $180^\circ < \alpha < 270^\circ$.

3.9. Uprość wyrażenia:

(a) $\sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha + \cos^3 \alpha$, (b) $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - \sin 2\alpha$,

(c) $\cos \alpha \cdot \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$, (d) $\operatorname{tg} \alpha \cdot \sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}$.

3.10. Sprawdź następujące tożsamości:

(a) $(\operatorname{tg}^2 x - \sin^2 x) \cdot \operatorname{ctg}^2 x = \sin^2 x$, (b) $(\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2 = 2$,

(c) $(1 + \cos x) \cdot (1 - \cos x) = \sin^2 x$, (d) $\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \cdot \sin^2 x$.

3.11. Narysuj wykresy podanych funkcji. Na ich podstawie określ zbiory wartości tych funkcji. Wskaż najmniejsze i największe wartości osiągnięte przez te funkcje (o ile da się wskazać).

(a) $y = \sin 2x$, (b) $y = |\cos x| - 1$, (c) $y = 2 - \sin x$,
(d) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, (e) $y = 2 \sin \frac{x}{2} - 1$, (f) $y = 1 - \frac{1}{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$,
(g) $y = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) - 1$, (h) $y = \operatorname{tg} 2x$, (i) $y = 2 + \sin 2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$,
(j) $y = \operatorname{tg} 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$, (k) $y = -\operatorname{ctg} \frac{x}{3}$, (l) $y = \frac{\operatorname{tg} x}{2}$,
(m) $y = \sin |x|$, (n) $y = \sin x + |\sin x|$, (o) $y = \frac{|\cos x|}{\cos x}$.

3.12. Zbadać, które z podanych funkcji są parzyste, a które nieparzyste:

(a) $y = \sin 3x$, (b) $y = \sin^2 x$, (c) $y = x \cos x$,
(d) $y = \sin x \cos x$, (e) $y = \frac{\sin x}{x}$, (f) $y = \frac{3 \sin x}{1 + 2 \sin^2 x}$.

3.13. Wyznacz okres podstawowy następujących funkcji:

(a) $y = \cos \frac{x}{2}$, (b) $y = \operatorname{tg} 3x$, (c) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$,
(d) $y = 1 + 2 \sin\left(\frac{3}{2}x\right)$, (e) $y = 1 - \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$, (f) $y = \operatorname{tg} \frac{2\pi x}{5} + \operatorname{ctg} \frac{2\pi x}{5}$.

